



© Marcel Burkhardt

## Potatura di siepi e arbusti nelle agglomerazioni: quando e come?

*Lungo le vie di traffico o al confine con vicine parcelle, siepi e arbusti devono essere tagliati regolarmente. Anche in assenza di regolamenti, una cura può essere utile, ad esempio, in modo che le specie a crescita lenta non vengano soffocate. La potatura degli arbusti dovrebbe tuttavia sempre essere fatta al di fuori del periodo di nidificazione, preferibilmente in inverno. A seconda del tipo di arbusto, vanno utilizzate tecniche di potatura diverse, descritte in questo foglio informativo.*

### Periodo ottimale per la potatura

Per la manutenzione di essenze legnose sui propri terreni si devono rispettare diverse norme, soprattutto lungo i confini con altre parcelle e vie di traffico. Potete ottenere informazioni più precise presso le amministrazioni comunali.

Ogni estate le autorità invitano i proprietari di terreni ridimensionare con una potatura siepi e alberi. Per la natura questo non è un buon momento perché è il periodo di nidificazione di molti uccelli

indigeni (Merlo, Verzellino, Verdone, Capinera, Beccafico, ecc.) e nel peggiore dei casi questi interventi possono portare all'abbandono di uova e piccoli.

La potatura dovrebbe quindi aver luogo al di fuori del periodo di nidificazione, di preferenza in inverno (novembre-marzo). A quel momento si disturbano meno piante e animali e la struttura dei rami degli arbusti è ben visibile, in modo che si può tener conto in maniera ottimale della

forma di sviluppo naturale delle piante. Per tener libere strade e sentieri bisogna potare generosamente. La cosa migliore è tenere una distanza sufficiente dalla via più vicina già al momento della piantagione, in modo che, anche anni più tardi, resti libera una fascia sufficientemente larga tra quest'ultima e la siepe. A questo proposito, tenete conto delle dimensioni che l'essenza legnosa in questione potrà raggiungere in quel luogo specifico!




## Tecniche di potatura

### Potatura selettiva

Le specie a crescita lenta necessitano di una potatura che lasci intatti i robusti rami laterali che danno la forma alla pianta, mentre al massimo un terzo dei rami più vecchi e grossi all'interno del cespuglio vanno recisi vicino al suolo. In questo modo si creano di nuovo spazio e luce per i giovani getti.

Adatta per:

- » Ligustro comune
- » Biancospino
- » Prugnolo
- » Corniolo sanguinello
- » Corniolo maschio
- » Rose selvatiche
- » Caprifoglio
- » Frangola comune
- » Olivella spinosa
- » Spinocervino
- » Berretto da prete (se cresce a più getti)
- » Viburno lantana e Palle di neve
- » Sambuco comune e Sambuco rosso



*Le specie a crescita lenta necessitano di una potatura che lasci intatti i robusti rami laterali che danno la forma alla pianta.*

© Stazione ornitologica svizzera

### Taglio di ridimensionamento


Con questa procedura tutto il cespuglio viene accorciato all'altezza desiderata (comunque non inferiore a 0,5 m). Se l'arbusto viene potato ogni anno (siepe bassa), l'altezza minima non dovrebbe essere inferiore a 1,0 m. Questo metodo è adatto a Prugnolo, Cornioli, Palle di neve e Viburno lantana, come pure Olivella spinosa e le diverse rose selvatiche, ma non alle altre essenze legnose.



*Se non volete lasciare che i cornioli crescano rigogliosi come qui, potete effettuare ogni anno un taglio di ridimensionamento, oppure tenerli squadriati. © Marcel Burkhardt*



*Il Biancospino non dovrebbe essere potato troppo radicalmente. © Martina Schybli*



*Recidere una pianta al piede significa effettuare un taglio all'altezza di 10-30 cm dal suolo. © Stazione ornitologica svizzera*

### Recidere al piede

Tutta la pianta viene recisa a 10-30 cm dal suolo e ricaccia in seguito dalla cepa. Questo metodo è adatto per Nocciolo, Carpino, Frassino, Ontani e Aceri. In un singolo anno dovrebbe essere potato in questo modo al massimo un terzo della lunghezza della siepe. I giardinieri naturali non consigliano questo metodo per la cura di arbusti all'interno degli agglomerati, ma solo per siepi con una lunghezza di oltre 30 m che si trovano in zone agricole. Siepi più corte dovrebbero venir potate in maniera selettiva (vedi più sopra).

## Come procedere per la cura di arbusti e siepi

Nei primi due anni dopo la messa a dimora di norma non è necessaria alcuna potatura. A partire dal terzo o quarto anno gli arbusti vengono potati ogni 2-3 anni, a seconda dello spazio a disposizione.

Le siepi sono particolarmente adatte alla nidificazione degli uccelli quando sono piuttosto dense. Ponete quindi attenzione a non diradare troppo gli arbusti al momento della potatura.

### La siepe quale habitat ...

Le siepi composte da arbusti indigeni sono importanti elementi naturali all'interno delle agglomerazioni e offrono un habitat a



innumerevoli specie animali. Per gli uccelli hanno un valore particolarmente elevato gli arbusti spinosi e a bacche. I loro rami dovrebbero essere potati sempre nello stesso punto: in questo modo si formano numerose ramificazioni adatte alla nidificazione.

Questo tipo di potatura è adatto per:

- » Biancospino
- » Prugnolo
- » Spinocervino
- » Rose selvatiche

Le siepi assumono importanti funzioni non solo per gli uccelli ma anche per insetti, mammiferi, rettili e anfibi: come nascondigli contro i nemici, ripari dalle intemperie e per riposarsi, dormire e allevare i piccoli, e infine come nutrimento (foglie, gemme, frutti, semi, insetti).



*Se la potatura viene effettuata sempre nello stesso punto, nel tempo l'arbusto si ramificherà e formerà siti di nidificazione per gli uccelli. © Stazione ornitologica svizzera*



*I frutti delle rose selvatiche sono ricercati da varie specie di uccelli. Con le loro spine, le rose selvatiche forniscono inoltre siti di nidificazione sicuri. © Marcel Burkhardt*

### ... anche in inverno

Per riguardo verso la fauna, in inverno gli arbusti che portano frutti dovrebbero venir potati il più tardi possibile poiché rappresentano un'importante fonte di nutrimento. In autunno è meglio lasciare sul terreno il fogliame sotto agli arbusti: solo così può infatti formarsi l'humus ideale per lo strato erbaceo di una siepe. Inoltre, per svernare e per l'allevamento dei piccoli, il Riccio necessita di un nido di foglie nascosto sotto gli sterpi. I rami tagliati non devono quindi necessariamente sempre venir triturati o smaltiti ma possono anche essere accatastati per formare un prezioso mucchio.



*I rami tagliati possono essere accatastati in un angolo poco utilizzato del giardino. In questo modo si creano luoghi di rifugio per uccelli, ricci e altri piccoli animali. © Michael Gerber*

### IMPRESSUM

© Stazione ornitologica svizzera, Ficedula & BirdLife Svizzera, Sempach, Magadino e Zurigo, 2023  
Copie del testo con citazione della fonte sono le benvenute.

**Stazione ornitologica svizzera** | Seerose 1 | 6204 Sempach | T +41 41 462 97 00 | [info@vogelwarte.ch](mailto:info@vogelwarte.ch) | [www.vogelwarte.ch](http://www.vogelwarte.ch)  
**Ficedula** | Vicolo Forte Olimpo 3 | 6573 Magadino | T +41 79 207 14 07 | [segreteria.ficedula@gmail.com](mailto:segreteria.ficedula@gmail.com) | [www.ficedula.ch](http://www.ficedula.ch)  
**BirdLife Svizzera** | Vicolo Forte Olimpo 3 | 6573 Magadino | T +41 91 795 12 80 | [ticino@birdlife.ch](mailto:ticino@birdlife.ch) | [www.birdlife.ch](http://www.birdlife.ch)